

平成25年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が6割以下

確認者印



栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成25年11月27日 関沢 真一

生産者No.	J0074	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	91 a
圃場筆数	3筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月(月/日)	8/5.

《 耕種概要 》

《 農薬資材使用概要 》

《 肥料資材使用概要 》

区分	内容	附記		
			種子更新	確認済
育苗管理	JA 種子もみ	20 Kg	確認済	
	JA以外 種子もみ			
播種月日(月/日)	4/16~4/20			
育苗様式	中苗			
本田管理	時期(月/日)	5/23~5/24		
	植付株数	43 株/坪		
	生育調整			
	中干し(月/日)	6/27		
	出穂期(月/日)	8/12		
	倒伏			
	收穫			
	生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用	確認済	
	作業形態	組織ライスセンター	委託	
	選別網目	1.90 mm	確認済	
乾燥・調製	10a当たり収量	600 Kg		
	1等米比率	100 %		
	月/日	出荷量(30kg目)	検査等級	玄米タンパク値(%)
	09/28	136	1等	5.8
09/30	46	1等	5.9	
計	182	5.9		

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	種子殺菌						
	苗殺菌						
本田	カスミン粒剤	4/13	20g		覆土混和	0	カスガマイシン塩酸塩(カウントなし)
	初期殺菌殺虫剤	5/23	50g		苗箱施用	2	プロベナゾール、ジノテフラン
除草剤	ヤイバ豆つぶ250	5/30		250g	散布	2	フェントラザミドピリメスルファン
	後期殺菌						
後期殺虫	ブラシンプロアブル	8/15		1000倍	100リッター 散布	2	フェリムソン、フラサイド
	MRジョーカーEW	8/15		2000倍	100リッター 散布	1	シラフルオフェン
計						7	

①

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
基肥	ホーネンス培土		2800g	56 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	追肥								
土づくり	硝安		5g	0.1 Kg	0.03	0.03			
	なたね油粕	5/3		40 Kg	2.00	0.00	0.80	0.40	
基肥	魚沼ロマンベ-ストS220	5/23		30 Kg	3.60	3.45	3.60	3.00	
	調整肥								
肥	ファイトアップ 水田用	6/23		0.5 Kg	0.02	0.02		0.05	
	魚沼ロマン有機穂肥	7/28		13 Kg	1.31	0.82	0.52	1.56	
穂肥	味好2号粒状有機	7/28		13 Kg	0.91	0.00	0.26	0.91	
	計					4.35			

②

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 3.7割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.4割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)