

# 平成24年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

生産者No.	J0030	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	198 a
圃場筆数	13筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	7/17, 9/6

栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成24年11月20日 湯沢利夫

確認者印



## 《 耕種概要 》

区分	内容	附記
育苗管理	種子更新	確認済 温湯済
	導入先	JA 種子もみ 40 Kg 確認済
	JA以外	種子もみ
	播種月日(月/日)	4/19~4/25
育苗様式	中苗	
本田管理	田植時期(月/日)	5/24~5/26
	植付株数	50 株/坪
	生育調整	清切り(月/日) 6/26~6/29 中干し(月/日) 6/27~6/30
	出穂期(月/日)	8/3~8/6
	倒伏	時期 程度 無
	收穫	時期(月/日) 9/15~9/27
	生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用 確認済
	作業形態	自己
	選別網目	1.90 mm 確認済
	乾燥・調整	
作柄・品質	10a当たり収量	540 Kg
	1等米比率	55 %
	月/日	出荷量(30kg個) 検査等級 玄米タンパク値(%)
	09/24	138 1等 5.6
計	139 5.6	

## 《 農薬資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	タフブロック	3/28	200倍		24時間浸漬	0	タロマイセスフラバス(カウントなし)
	タチガレン粉剤	4/14	7g		床土混和	1	ヒドロキシソキサゾール
本田	Drオリセスターク箱粒剤	5/23		50g	箱施用	2	フロベナゾール、ジノテフラン
	ヤイバ豆つぶ250	5/30		250g	散布	2	フェントラザミド、ピリミスルファン
後期殺菌	バサグラン粒剤	7/8		3Kg	散布	1	ペンタノンナトリウム塩
	計					6	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 3.2割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

## 《 肥料資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
育苗	ホーネンス培土		2800g	56 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	くみあい液肥2号		20g	0.4 Kg	0.04	0.04	0.02	0.04	
本田	魚沼ロマンソイルキーパー	5/13		30 Kg	0.00	0.00	1.80	1.20	アルカリ18.0%、けい酸23.0%、苦土4%、腐植酸%
	魚沼ロマンベストS220	5/24		29 Kg	3.49	3.34	3.48	2.90	
調整肥	マルチサポート2号	8/12		20 Kg	0.00	0.00			けい酸20%、苦土12%
	ファイトアップ 水田用	7/2		0.5 Kg	0.02	0.02		0.05	
	食味一番	8/12		15 Kg	0.00	0.00	2.40		苦土15%
	魚沼ロマン有機堆肥	7/18		20 Kg	2.00	1.26	0.80	2.40	
粒状発酵とん糞	7/18		7.5 Kg	0.24	0.00	0.60	0.21		
計						4.69			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.7割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)