

平成24年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

生産者No.	J0036	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	186 a
圃場筆数	9筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	7/18, 9/6

栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成24年11月20日 湯沢利夫



《 耕種概要 》

区分	内容	附記	
育苗管理	種子更新	確認済 温湯済	
	導入先	JA 種子もみ 60 Kg 確認済	
	JA以外	種子もみ 苗	
	播種月日(月/日)	4/21	
育苗様式	中苗		
本田管理	田植	時期(月/日) 5/20~5/25 植付株数 50 株/坪	
	生育調整	濃切り(月/日) 6/23~6/24 中干し(月/日) 6/20	
	田圃期(月/日)	8/5~8/8	
	倒伏	時期 程度 無	
	收穫	時期(月/日) 9/16~9/27	
	生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用 確認済	
	乾燥調整	作業形態 自己 選別網目 1.90 mm 確認済	
	作柄・品質	10a当たり収量	600 Kg
		1等米比率	63 %
		月/日	出荷量(30kg箱) 検査等級 玄米タンパク値(%)
09/20		72 1等 6.0	
09/22		49 1等 5.9	
09/22	60 1等 6.0		
計	181	6.0	

《 農薬資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	タフブロック	4/19	200倍		24時間浸漬	0	タロマイセスフラバス(カウントなし)
	種子殺菌						
本田	初期殺菌殺虫	5/20		500g	ベスト肥料混和	2	プロベナゾール、ジノテフラン
	除草剤	5/27		250g	散布	2	フェントラザミド、ピリミスルファン
本田	除草剤	7/16		500ml	散布	1	ペンタゾンナトリウム塩
	後期殺菌	8/12		1000倍	100リッター 散布	3	フェリムン、フラサイド、シラホール
後期殺菌							
計						8	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 4.3割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

《 肥料資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
育苗	ホーネンス培土		2800g	56 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	追肥								
本田	基肥								
	主肥料								
本田	基肥	5/20		30 Kg	3.60	3.45	3.60	3.00	
	調整肥	7/1		20 Kg	0.00	0.00		4.00	けい酸34%, 苦土4%, ぼうろ素0.1%
本田	種肥	7/19		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
	種肥	7/27		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
計						4.74			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.8割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)