

平成24年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

生産者No.	J0059	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	74 a
圃場筆数	8筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月(月/日)	8/3, 9/11

栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成24年11月20日 湯沢利夫

確認者印



《 耕種概要 》

《 農薬資材使用概要 》

《 肥料資材使用概要 》

区分	内容	附記		
			種子更新	確認済
育苗管理	導入先	JA		
	種子もみ	180箱	確認済	
JA以外	種子もみ			
苗	苗			
播種月日(月/日)	4/6~4/22			
育苗様式	中苗			
本田管理	田植時期(月/日)	6/11		
	植付株数	60株/坪		
	生育調整			
	中干し(月/日)			
出穂期(月/日)	8/12~8/16			
倒伏	時期			
	程度	無		
収穫	時期(月/日)	10/6		
	生育期間での除草剤使用	未使用	確認済	
乾燥・調製	作業形態	JAライスセンター	委託	
	選別網目	1.90mm	確認済	
作柄・品質	10a当たり収量	470Kg		
	1等米比率	100%		
	月/日	出荷量(30kg個)	検査等級	玄米タンパク値(%)
	10/09	114	1等	5.8
計	114	5.8		

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	タフブロック	4/16	200倍		24~48時間浸漬	0	タラロマイセスフラバスクウントなし
	タチガレン液剤	4/16	1000倍		1.0リッター床土灌注	1	ヒドロキシシソキサゾール
初期殺菌殺虫	側条オリゼートスターク	6/11		500g	ペース肥料混和	2	プロベナゾール ジメチフラン
	粒粒水和剤						
除草剤	マイバジャンボ	6/18		250g	散布	2	フェントラザミドピリミルファン
計						5	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 2.7割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
基肥	ホーネンス培土		2800g	56Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
追肥	べんとう肥		13g	0.26Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	硫酸		5g	0.1Kg	0.03	0.03			
	くみあい液肥2号		20g	0.4Kg	0.04	0.04	0.02	0.04	
土づくり	高度ケイサンようりん	5/19		100Kg	0.00	0.00	20.00		アルカリ45% けい酸26% 苦土12%
	ワラ分解キング	H23/10/9		10Kg	0.00	0.00			
基肥	魚沼ロマンペースS220			30Kg	3.60	3.45	3.60	3.00	
	なたね油粕	5/23		20Kg	1.00	0.00	0.40	0.20	
	粒状発酵けい糞	5/19		30Kg	0.60	0.00	1.95	0.90	
調整肥	けい酸加里プレミア34	7/8		20Kg	0.00	0.00		4.00	けい酸34% 苦土4% ほう素0.1%
穂肥	魚沼ロマン有機穂肥	7/28		10Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
	魚沼ロマン有機穂肥	8/4		10Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
計						4.84			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.9割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)